

Topologie algébrique

Série 8

19.04.2016

L'exercice 2 est à rendre le 26.04.2016.

1. Soit $n \geq 1$. Montrer qu'il n'existe aucune rétraction $r : D^n \rightarrow S^{n-1}$ (i.e., aucune application continue r telle que sa restriction à S^{n-1} soit l'identité). Dédire que toute application continue $f : D^n \rightarrow D^n$ admet au moins un point fixe, i.e., il existe $z \in D^n$ tel que $f(z) = z$.

2. Soit $n \geq 1$.

(a) Soit $f : S^n \rightarrow S^n$ une application continue. Montrer qu'il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que pour tout isomorphisme $\alpha : H_n^{\text{sing}} S^n \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}$

$$\alpha \circ H_n^{\text{sing}}(f) \circ \alpha^{-1}(1) = m.$$

Cet entier, noté $\deg f$, est appelé le *degré* de f .

(b) Montrer que $\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f)$ quelques soient $f, g : S^n \rightarrow S^n$. En déduire que $\deg \text{Id}_{S^n} = 1$, que $\deg c_{z_0} = 0$ pour tout $z_0 \in S^n$ (où c_{z_0} désigne l'application constante sur z_0), et que $\deg h = \pm 1$ pour tout homéomorphisme $h : S^n \rightarrow S^n$.

(c) Soit $[S^n, S^n]$ l'ensemble des classes d'homotopie d'applications de S^n vers S^n . Montrer qu'il y a une application surjective bien définie

$$\delta : [S^n, S^n] \rightarrow \mathbb{Z} : [f] \mapsto \deg f.$$

(d) Montrer que si $n = 1$, alors $\delta([f]) = 0$ si et seulement s'il existe $z_0 \in S^1$ tel que $f \simeq c_{z_0}$.